

INFORMACINIS LAPELIS

1% ORTOFENO GELIS

Nesteroidinis priešūždegiminis vaistas

INN Diclofenacum natricum

ATC kodas MO1A BO5

Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Veiklioji medžiaga. Vienaame grame ortofeno gelio yra 10 mg veikliosios medžiagos natrio diklofenako.

Pagalbinės medžiagos. Izopropilspiritas (*Alcohol isopropylicus*), propilenglikolis (*Propylenglycolum*), karbopolis 940 (*Carbomera*), trietanolaminas (*Triethanolaminum*), metilparabenas (*Methylis parahydroxybenzoas*), išgrynintas vanduo (*Aqua purificata*).

Cheminis pavadinimas

2-[(2,6 dichlorfenil) amino] fenilacto rūgšties natrio druska.

Farmakologinė informacija

Ortofenas yra nesteroidinis, skausmą malšinantis, priešūždegiminis ir karščiavimą mažinantis vaistas. Ortofenas blokuoja prostaglandinų sintezę, kadangi slopina fermento ciklooksigenazės bei fagocitų lizosomų fermentų aktyvumą.

Indikacijos

Sąnarių ir stuburo degeneracinių bei reumatinių ligų, uždegimo, patinimo, sportinių ir buitinių traumų sukeltam skausmui malšinti.

Kontraindikacijos

Nėštumo laikotarpis. Padidėjęs jautrumas ortofenui. Pažeista oda, atvira žaizda.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Pažeistą vietą reikia patepti 2-4 g gelio. Tokio kiekio pakanka 400-800 cm² odos plotui patepti. Gelį reikia į odą įtrinti. Procedūrą per dieną galima pakartoti 3-4 kartus.

Atsargumo priemonēs

Gelī galīma vartoti tik ī īšorēs !

Preparatā reīkia saugoti nuo vaikū !

Pasībaigus nurodytam ant pakuotēs tinkamumo laikui, medīkamento vartoti draudīama !

īalutinis poveikis

Patepus geliu odā, labai retai gali atsirasti odos alerģinē reakcija.

Jei pasīreiīkia nemīnētas īīame īnformacīnīame lapelyje nepageīdaujamas poveikis, reīkia kreiptis ī gydytojā ar vaistīnīkā.

Vaistū sāveīka

Tokia sāveīka nepastebēta.

Pakuotē

Alīuminio tūbelē, kurioje yra 15-50 g gelio.

Laikymo sālygos

Medīkamentā reīkia laikyti kambario temperatūroje, sausoje, apsaugotoje nuo saulēs īvīesos vīetoje.

Tīnkamumo laīkas

2 metai.

Gamīntojas

SIA "LMP", Līela g. 71, Ryga, LV-1016, Latvija

Paskutīnē teksto perīziūros data

2000 07 18

11 NO12805
94/15 24/12

Informacija vartotojui

**ORTOPHENUM /Diclofenacum natricum/
ORTOFENAS /Diklofenako natriis/**

Tabletėje su apvalkalu yra 0,015 arba 0,025 veikliosios medžiagos
Ortofeno cheminis pavadinimas - 2-2,6 dichlorfeninio amino fenilo acto
rūgšties natrio druska.

Tabletės apvalkalas (geltonos spalvos) suyra žarnyne.

Farmakologinės savybės

Ortofenas yra nesteroidinis antiuždegiminis vaistas, kuris mažina pakilusią kūno temperatūrą, skausmą ir uždegimą. Šis ortofeno poveikis yra stipresnis palyginti jį su aspirinu, ibuprofenu ir naproksenu. Ortofenas slopina trombocitų agregaciją ir stiprina antikoagulantų poveikį bei mažiau nei kiti vaistai dirgina virškinimo organų gleivinę.

Vartojimo indikacijos

Ortofeną galima vartoti suaugusiųjų reumatoidiniam artritui, reumatui, osteochondrozei ir kioms uždegiminėms bei degeneracinėms sąnarių ligoms gydyti. Vaisto galima skirti po operacijų ar traumų ir kitos kilmės skausmui malšinti.

Vartojimas ir dozavimas

Suaugusiajam reikia vartoti po 0,025-0,05 gramo (1-2 tabletės) tris kartus per dieną. Sveikstant vaisto dozę galima mažinti iki 0,025 gramo tris kartus per dieną. Tabletes reikia nuryti nekramčius valgio metu arba tuojau pat po valgio. Gydomo trukmė apie 5-6 savaites.

Nuo 1,5 iki 12 metų vaikams reikia skirti 0,015-0,03 gramo (1-2 tabletės) 2-3 kartus per dieną. Vidutinė gydomoji dozė - 2-4 mg/kg. Vyresniems kaip 12 metų vaikams galima skirti tokiomis dozėmis, kurios atitinka rekomenduojamas suaugusiems. Gydomo trukmė nuo 2-3 savaičių iki trijų mėnesių.

Gydant ilgai, reikia tikrinti ligonių kraują.

Šalutinis poveikis

Ortofenas gali sukelti pilvo skausmą, riaugėjimą, pykinimą, viduriavimą, nestiprų galvos svaigimą bei skausmą, odos alerginių reakcijų ir arterinio kraujospūdžio padidėjimą. Pasitaiko retų atvejų, kai padidėja kepenų fermentų aktyvumas, paūmėja lėtinis gastritas.

Kontraindikacijos

Negalima vartoti ortofeno sergantiems skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opalige, inkstų bei kepenų nepakankamumo ligomis, nėščioms moterims (pirmuosius tris nėštumo mėnesius) ir asmenims, kurie yra jautrūs ortofenui.

Išleidimo forma

Tabletės su apvalkalu po 0,025 gramo (25 mg) ir 0,015 gramo (15 mg) - vaikams.

Laikymo sąlygos

Tabletes reikia laikyti sausoje ir tamsioje vietoje. Vaistas išduodamas pagal receptą. Tinka vartoti trejus metus.

Gamintojas

OLAINFARM